




WEW: INDAMMEN VAN RIVIERKREEFTEN, MIDDELS DE KREEFTEN-KRABBENSLEUF

MICHIEL CORNELIS
18-11-2025

- Rivierkreeften en krabben + probleemstelling
- Verspreiding uitheemse kreeften en krabben bij WSBD
 - Beheergebied
 - Data verzamelen
 - Afvangen met fuiken
- Krabbensleuf (VMM)
- Ombouwen krabbensleuf naar 'kreeftensleuf' + WEW (2022)
- Werking van Kreeften-Krabbensleuf
- Doorkijk naar resultaten bij WENR (2023 - 2024)
- Casus 2025 met tussentijdse conceptresultaten
- Vervolg

RIVIERKREEFTEN EN KRABBEN

- 7 uitheemse rivierkreeften + Chinese/ Japanse wolhandkrab (+ Calicotkreeft sinds 2025?)
- Verspreiding soorten
- Invasie-curve -> probleem?

Naam: Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft <i>Faxonius limosus</i> (Raffinesque, 1817) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 1968 	Naam: Marmerkreeft <i>Procambarus fallax</i> cf. <i>virginialis</i> (Hagen, 1870) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2004 	Naam: Rode Amerikaanse rivierkreeft <i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 1985 	Naam: Turkse rivierkreeft <i>Pontastacus leptodactylus</i> (Eschscholz, 1823) Herkomst: Oost-Europa – Azië Sinds: 1977 
Naam: Californische rivierkreeft <i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2004 	Naam: Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft <i>Faxonius virilis</i> (Hagen, 1870) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2004 	Naam: Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft <i>Procambarus acutus</i> (Girard, 1852) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2002 	Naam: Calicotkreeft 


Naam: Ch. of J. Wolhandkrab

Herkomst: Azië


Sinds: 1931



© Jelger Herder



Verspreiding Amerikaanse rivierkreeften in Nederland (Rivierkreeft.nl)



©Roessink et al., 2024

PROBLEEMSTELLING

- Verschillende uitheemse soorten
 - Ecologie verschilt, schade niet
 - Visserijwet 1963
- Gevaar voor biodiversiteit
 - "Omnivoren"
- Gevaar KRW- doelen
 - Verknippen waterplanten
 - Waterbodems omwoelen → slechtere waterkwaliteit
- Gevaar voor waterveiligheid en onderhouden

Naam: Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft <i>Faxonius limosus</i> (Raffinesque, 1817) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 1968	Naam: Marmerkreeft <i>Procambarus fallax</i> cf. <i>virginialis</i> (Hagen, 1870) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2004	Naam: Rode Amerikaanse rivierkreeft <i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 1985	Naam: Turkse rivierkreeft <i>Pontastacus leptodactylus</i> (Eschscholtz, 1823) Herkomst: Oost-Europa – Azië Sinds: 1977
			
Naam: Californische rivierkreeft <i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2004	Naam: Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft <i>Faxonius virilis</i> (Hagen, 1870) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2004	Naam: Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft <i>Procambarus acutus</i> (Girard, 1852) Herkomst: Noord-Amerika Sinds: 2002	
			

Naam: Ch. of J. Wolhandkrab

Herkomst: Azië

Sinds: 1931






© Jelger Herder



© UA

→ Vegetatie na 12 dagen verdwenen met 8 krabben!





‘NL in het klein’

- Zand en klei

KRW:

- 25 KRW-wateren
- R- en M-typen

Beleid plaagsoorten:

- Inzet op natuurlijke inrichting
 - Drempelwaarde rivierkreeften:
 $0,7 - 1 \text{ kreeft /m}^2$
- Verspreiding voorkomen + beheersen/beheren (+ bestrijden)
→ Hoe en waar?




VERSPREIDING UITHEEMSE KREEFTEN EN KRABBEN BIJ WSBD (2024)

Data verzameld met dank aan de muskusrattenvangers!


Witte vlekken


Aantal stuks



Enkel locaties waar MURA fuiken staan!

VERSPREIDING WSBD - NDFF



Kreeftendashboard -> eerste indicatie van waarnemingen en soorten gemeld door onderzoeksbureaus, etc.



GEGEVENSVERZAMELING: NDFF VS. MURA

Witte vlekken

Aantal stuks





Kreeften dashboard

- Waarnemerseffect (in polders bijna niets)
- Inzicht in soorten bij NDFF (gevalideerd) vs. Mura (aan-of afwezigheid kreeft/krab)

Afvangen met fuiken – **nuance!**


- Kreeften > 6cm worden gevangen, juvenielen (vaak) niet
- Langdurig doorvangen, maar effect is vaak ‘tijdelijk’ (verjonging tegen gaan)
 - Vb. Populatiemodel rode Am. Rivierkreeft (Kanters, 2023)
- Kostentechnisch + waar begin je?
 - **Let op: voordeur afsluiten! → Indammen: rol voor kreeften- krabbensleuf?**




© Kanters, 2023

KRABBENSLEUF (VMM)

- In 2018 eerste krabbensleuf aangelegd na proeven bij UA
- “Brievenbus met oploopplaten”
 - Vistrap in Kleine Nete (Grobendonk, Vlaanderen)
- Efficiëntie en vangstresultaten



© VMM




© VMM




This is what the trap looks like under water during the construction work. (Photo: Paul van Loon)

© VMM

OMBOUW KRABBENSLEUF -> KREEFTENSLEUF + WEW 2022




Samenwerking: Universiteit Antwerpen, VMM, WENR, WSBD (initiatiefnemer + bedenker)



SLEUVEN IN DE PRAKTIJK BIJ WENR (2023 – 2024)

- Praktijkproeven in gecontroleerde, wetenschappelijke setting (Sinderhoeve)
- Genummerde rode Am. rivierkreeften
 - 150 stuks per sloot (40 m lang)
- Verschillende condities
 - Stromende beek ($< 45^\circ$, 2 sleuven)
 - Poldersloot/ stadswater ($< 60^\circ$, 1 sleuf)
- Resultaten (Roessink et al., 2024):
 - Efficiëntie wegvangen: 73,3 – 75%
 - Invangefficiëntie sleuf: 93%
 - Kleine ($< 6\text{cm}$) en grote ($> 8\text{cm}$) dieren
- Bijvangst?
 - Proeven met pootaal = geen bijvangst!
 - geen nadelig effect op migratie
- Samenwerking: WSBD (trekker en bedenker), WSDD, HHSK, HHD en WENR



© F. Ottburg

- Onderzoek: maart/ april – november 2025
 - In samenwerking met vrijwilligers TWM + WENR + WSBD collega's
- Inventariseren naar populatie kreeften in de Oude Leij (lokaal) + functionaliteit kreeftensleuven
- **Pilot:** Rekeninghoudend met huidig beleid + dierenwelzijn!
 - ➔ Doel: Onderzoek naar toepasbaarheid kreeftensleuven in de praktijk

© Michiel Cornelis



CONCEPT RESULTATEN 2025



- Definitieve rapportage wordt voorjaar 2026 verwacht.
- Tussentijdse concept resultaten:
 - Meer dan 60kg kreeft afgevangen in beekstroom
 - Dagelijks kreeften in opvangbakken:
 - min: 0 -> door droogte
 - max: 55 (na droogte – half september)
 - Beide soorten: Meer rode Am. dan Calif.
 - Bovenstroomse sleuf vangt meer
 - Overdag ook beweging richting oploophuis
- Erg droog jaar!!!
 - Invloed op resultaten?



→ Samenwerking met WENR en vrijwilligers
Kaaistoep!



- Strategie omgang rivierkreeften en krabben voor WSBD (en Prov. Brabant) – Brabant breed
 - Voordeur sluiten (?) + focusgebieden aanduiden
- Opschaling kreeftensleuven
 - Kosten- batenafweging + combinatie met overige bekende methodieken (bv. fuiken voor bereiken drempelwaarde)
 - Intussen inzet op monitoring in nog niet bezette gebieden door rivierkreeften (bv. Boven Mark + Merkske) + onderzoek plaatsing kreeften-krabbensleuf op deze locatie.
- Onderzoekspilot in poldergebied (?)





VRAGEN?

MICHIEL CORNELIS (SNR. ECOLOOG WSBD)

MAIL: M.CORNELIS@BRABANTSEDELTA.NL

- Interacties tussen rivierkreeften en omgeving (STOWA, 2025)

